

داء البروسيلات في محافظة كردستان ما بين عامي 1997 و 2003.

غوباد مرادي، نادر إسماعيل نساب*، إبراهيم غادري، مرزيه صوفي ماجدبور، حميدة سليم زاده.

الملخص:

المقدمة: داء البروسيلات ، وهو أحد الأمراض الحيوانية المصدر ، أهمية كبرى فيما يتعلق بالصحة العامة وبتأثيره على الحالة الاقتصادية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم ، وخصوصاً في الدول النامية . يقوم هذا المسح بتحليل الحالة الوبائية داء البروسيلات في محافظة كردستان .

المواد وطرق البحث: هذا البحث هو دراسة وصفية تحليلية تم فيها تقييم 3880 من حالات داء البروسيلات ما بين عامي 1997 و 2003 . اعتبرنا أن عيار 1:1 أو أكثر ، باستخدام طريقة التراص الأنبوبي القياسية ، يمثل نتيجة إيجابية . تم تجميع هذه البيانات من مختبرات المحافظة بصفة أسبوعية . تم تحليل بيانات المرضى ووصفها باستخدام البرنامج الإحصائى SPSS .

النتائج: تمت دراسة ثلاثة آلاف وثمانين من حالات العدوى بداء البروسيلات . في هذه الدراسة كان 2020 (52.1 %) ذكوراً، و 1860 (47.9 %) من الإناث ، و 707 (18.2 %) من سكان المدن ، و 3173 (81.8 %) من سكان الريف . ظهر المعدل الأعلى للوقوع ، مع حدوث 89 حالة عدوى لكل 100000 من السكان ، في عام 2003 ؛ والأقل ، مع حدوث 17 حالة عدوى لكل 100000 من السكان ، في عام 2000 . ظهر المعدل الأعلى للوقوع بين ربّات البيوت ، بنسبة 39.4 % . كانت هناك علاقة بين الجنس من ناحية ، وبين كل من العمر ($p < 0.001$) ، ومكان المعيشة ($p < 0.05$) .

الاستنتاج: وفقاً لهذه الدراسة ، كان الذكور الذين يعيشون في القرى والبلائيين في المدن هم المجموعات الأكثر تأثراً . إن تدريب الناس ، وخصوصاً القرويين والنساء اللاتي يعيشن في المدن ، حول طرق انتقال المرض ، وطرق الوقاية ، ومراقبة إمدادات وإيتاء الأطعمة ، من الممكن أن تقلل من انتشار المرض .

الكلمات الدليلية: داء البروسيلات ؛ علم الأوبئة .

* المراسلة: جامعة كردستان للعلوم الطبية، سننداج، ايران.

الترجمة: د. ايها عبد الرحيم.