

العلاج الإشعاعي لحساسية الأنف الغير متجاوبة إلى العلاج الدوائي في قطاع غزة - فلسطين.

شعبان مرتجي، سمير كحيل*.
وزارة الصحة- فلسطين.

الملخص:

ما زالت المعالجة المثالية لحساسية الأنف و التي لاستجيب إلى العلاج الدوائي غير متوفرة. إنّ هدف الدراسة تقييم كفاءة الجراحة بالأشعة لحساسية الأنف الغير متجاوبة إلى العلاج الدوائي. عشرون مريضاً عولجوا وتبعوا لفترتين، 6 شهور و 12 شهر. النتائج: لا أحد من المرضى الـ 20 كان عندهم مضايقة واضحة، لا مضاعفات جانبية بضمن ذلك النزف، عدوى، التصاق، ولا تدهور لأعراض الحساسية. الرشح الأنفي تحسّن بعد 6 شهور بين 14 (70%) (p value 0.03) من الحالات ونزل العدد إلى 11 (55%) حالة ونزل العدد إلى 16 (80%) (p value 0.0016) بعد 12 شهر. الأعراض الأخرى بضمن ذلك حكة أنفي، عطس، شخير، صداع، حكة في العين أيضاً فقدان حاسة الشم اظهرت تحسناً مثيراً. الخلاصة: يبدو العلاج الإشعاعي أداة فعالة وآمنة للمعالجة لحساسية الأنف الغير متجاوبة إلى العلاج الدوائي. في المستقبل، العلاج الإشعاعي لها الإمكانية لكي تكون إحدى الخيارات الجراحية الأكثر شيوعاً وتساعد على معالجة حساسية الأنف.

*وزارة الصحة- غزة

samirkuhail@yahoo.com