

**شعبان مرتجى، سمير كحيل\* و محمد ظليب.**  
وزارة الصحة- غزة فلسطين.

## استخدام منظار القصبة الهوائية الصلب لعلاج استنشاق الأجسام الغريبة لدى الأطفال في مستشفى الشفاء – غزة.

ملخص الدراسة:

الغرض من الدراسة: تسليط الضوء على حالات استنشاق الأجسام الغريبة والتي تم علاجها باستخدام منظار القصبة الهوائية الصلب في قسم الأنف و الأذن و الحنجرة داخل مستشفى الشفاء. عدد الحالات المحولة إلى القسم نتيجة للاشتباه باستنشاق أجسام غريبة 150 حالة. من هذه الحالات 104 (69.3%) استنشقوا أجسام غريبة و 46 (30.7%) لديهم اعتلالات في الجهاز التنفسي. تتراوح أعمار المرضى من شهر إلى 8 سنوات. الذكور/الإناث 36/63.3. أظهرت النتائج أن عدد الذين أكتشف عندهم أجسام غريبة هو 88 (58.75%) ، مكانها كالتالي: تحت المزمار 3 (3.4%) حالة، القصبة الهوائية 14 (15.9%)، الشعبية الهوائية اليمنى 46 (52.3%)، الشعبية الهوائية اليسرى 25 (28.4%).

أنواع الأجسام الغريبة: نواة البطيخ و فول الصويا كل منها 35 (39.8%)، طعام صلب 14 (15.9%)، قطع بلاستيكية 4 (4.5%). تم إزالة الأجسام الغريبة من 147 (98%) حالة من المحاولة الأولى و الباقين في المحاولة الثانية. لم تسجل أي حالة وفاة خلال فترة الدراسة. الاستنتاج: إزالة الأجسام الغريبة باستخدام منظار القصبة الهوائية الصلب آمن فعال و لا توجد أي مبالغة باستخدامه في إزالة الأجسام الغريبة في مستشفى الشفاء - غزة.

\* عنوان المراسلة:

Samir Kuhail: MD, Mph  
Health research directorate, Ministry of Health  
Gaza-Palestine.  
[samirkuhail@yahoo.com](mailto:samirkuhail@yahoo.com)